

Mise en place d'implants pectoraux

Intervention :

- Sous anesthésie générale
- Durée : 1 heure à 1 heure 15

Suites :

- douloureuses pendant une semaine, surtout les 2 - 3 premiers jours (tension sous la peau, sensation possible d'oppression thoracique, gêne au lever des bras)
- drainage 24 H
- hospitalisation 2 jours (1 nuit)
- soins par infirmière tous les 2 à 3 jours pendant 2 semaines
- Aspirine interdite pendant 1 semaine avant et après l'intervention
- boléro de contention à porter 1 mois jour et nuit
- œdème environ 1 mois
- trouble de la sensibilité des mamelons quelques jours à quelques semaines
- contrôles post-opératoires par le chirurgien à :
 - 15 jours
 - 3 mois, 6 mois, 1 an
 - puis à partir de 10 ans : contrôle échographique de l'intégrité des prothèses.

Complications possibles : rares

- immédiate :
 - hématome pouvant nécessiter, s'il est volumineux, une évacuation sous anesthésie
 - infection pouvant nécessiter l'ablation de la prothèse
- à distance :
 - malposition de la prothèse (à craindre en cas de reprise trop précoce de l'activité)
 - coque périprothétique : sein devenant plus ferme et aux contours plus marqués, pouvant nécessiter le changement de la prothèse (moins de 5% des cas)

- rupture de la prothèse (nécessité d'un choc violent de type "accident de voiture") : obligation de l'ablation de la prothèse (et remplacement)
- en cas de rupture ou de suintement du silicone à travers le paroi (risque accru au-delà de 10 ans) : risque de diffusion du silicone dans l'organisme avec un risque très légèrement accru de maladies auto immunes (Connectivites). Ce risque dans la population globale est compris entre 0,5 et 7 cas / 100 000 habitants. Il augmente en cas de prédisposition génétique ou d'antécédents familiaux. Ce risque serait multiplié par 1,24 chez les patients porteurs de prothèses en gel de silicone.

Sauf cas particulier, aucun médicament contenant de l'aspirine ou des anti-inflammatoires ne devront être pris dans les dix jours précédant l'opération.

L'arrêt du tabac est recommandé au moins un mois avant et un mois après l'intervention (le tabac peut être à l'origine d'un retard de cicatrisation).